

Chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791

1

Umyj ręce łagodnym płynem do mycia przez 1 minutę. (Lifosan Soft, Softaskin). Starannie splucz ręce.



4

Wcieraj środek dezynfekujący w skórę małymi porcjami, stopniowo przez 3 minuty (w zależności od stosowanego preparatu). W pierwszej kolejności zdezynfekuj ręce oraz przedramiona, aż do łokci włącznie.



2

Osusz dokładnie ręce za pomocą jednorazowego ręcznika lub sterylnego materiału.



5

Następnie zdezynfekuj dolną połowę przedramion, a na końcu zdezynfekuj dłonie. Przez cały czas stosowania preparatu ręce muszą być mokre. Ostatnią porcję wcieraj aż do całkowitego wyschnięcia.



3

Aplikuj środek dezynfekujący (Promanum N, Softa-Man) na suchą dłoń. Użyj łokcia, aby nacisnąć dźwignię dozownika.



6

Po przeprowadzeniu procedury dezynfekcji dłonie i przedramiona muszą być suche. Nie zakładaj rekawiczek na mokre dłonie



Mycie Lifosan Soft
Softaskin

Dezynfekcja Promanum Pure
Softa Man
Softa Man Visco Rub

Pielęgnacja Trixo
Trixo Lind

Higieniczna dezynfekcja rąk według EN 1500

1

Pocieraj wewnętrzne części dłoni (jedna dłoń o dłoń drugą).



4

Pocieraj grzbietowe części złączonych palców jednej dłoni o wewnętrzną część drugiej dłoni i odwrotnie.



2

Pocieraj wewnętrzną część jednej dłoni o grzbietową część drugiej dłoni i odwrotnie.
Pamiętaj o przestrzeniach między palcami po grzbietowej stronie dłoni.



5

Pocieraj ruchami obrotowymi kciuk lewej dłoni o wewnętrzną część zaciśniętej na nim dłoni prawej, a następnie odwrotnie.



3

Pocieraj wewnętrzne części dłoni z splecionymi palcami.



6

Pocieraj ruchami obrotowymi opuszki palców prawej ręki w zagłębieniu dłoni lewej a następnie odwrotnie.



Mycie Lifosan Soft
Softaskin

Dezynfekcja Promanum Pure
Softa Man
Softa Man Visco Rub

Pielęgnacja Trixo
Trixo Lind